

FAMIGLIA *TURDIDAE*

TORDELA *Turdus viscivorus* Linnaeus 1758


Corologia Corologia olopaleartica.

Fenologia

Popolazioni europee sedentarie, migratrici e svernanti regolari. In Italia e nelle Marche migratrice regolare, svernante. La migrazione pre-riproduttiva avviene tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile. Nidifica da marzo a giugno per lo più sugli alberi.

Areale di distribuzione

Diffusa dal Nord Africa all'Europa ed Asia dove risulta sedentaria e migratrice nelle regioni meridionali del suo areale. In Italia la sua distribuzione riguarda prevalentemente le aree Appenniniche ed Alpine ed in particolare tra i 700 ed i 2000 m s.l.m. (BirdLife International, 2004).



(BirdLife, 2008)

Distribuzione regionale

Rara e localizzata, durante l'estate vive in boschi montani sino a 1400 m di quota e campagne alberate di collina; d'inverno e nei passi frequenta anche campagne alberate, parchi urbani e frutteti a più bassa quota. Si tratta di una specie molto schiva della quale è difficile effettuare osservazioni.

Preferenze ecologiche

Generalmente la sua presenza è legata ad ambienti con zone alberate, mai molto fitte, intervallate da prati e radure. Nidifica per lo più sugli alberi; migra da marzo a metà aprile e da ottobre a metà novembre; sverna in Europa centrale e meridionale, Italia compresa, Africa e Asia, oppure si mantiene sedentaria spostandosi a quote inferiori.


Stato di conservazione

La popolazione italiana è in leggero declino (BirdLife International, 2004).

Livelli di tutela

Dir 79/409/CEE All. II, Berna All. III, BirdLife International, 2004. *Turdus viscivorus*. In: 2007 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2007

Distribuzione potenziale



(Boitani *et al.* 2002)