

LIFE+ EC-SQUARE ROSSO SCOIATTOLO



Guida al riconoscimento delle specie di scoiattoli presenti in Italia



Foto di: Veronique Adriaens, Sandro Bertolino, Dario Capizzi, Jean-Louis Chapuis, Monica Chasseur, Nicola Cordero di Montezemolo, Dario De Siena, Emanuele Fasce, Laura Guichón, Peter Lurz, Carlo Morelli, Fernando Milesi, Ambrogio Molinari, Matteo Negro, Johan Seys, Alain Pizzinat.



SCOIATTOLO COMUNE o ROSSO (*Sciurus vulgaris*)

Unica specie nativa in Italia.

Scoiattolo arboricolo di taglia media (adulti 270-360 g); unica specie di scoiattolo nativa in Italia. Il mantello può essere molto variabile come colorazione e tonalità.


- ✓ Mantello di colore variabile dal rosso al grigio, talvolta nero.
- ✓ Assenza della banda bianca nella parte esterna della coda.
- ✓ Ciuffi auricolari in genere presenti, possono mancare in estate.



Mantello di colore variabile, dal rosso, al marrone, grigio e nero



Ciuffi auricolari non sempre presenti



SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)


Specie introdotta in Italia; origine nord America.

Gli individui adulti sono più grossi (500-650 g) e di corporatura massiccia rispetto agli scoiattoli rossi.


- ✓ Il mantello è grigio con parti rosso mattone sulle zampe, la testa, la coda e talvolta il dorso.
- ✓ La colorazione è molto simile in tutte le popolazioni presenti in Italia.
- ✓ Caratteri evidenti sono la mancanza di ciuffi auricolari e una banda bianca nella parte esterna della coda.



Banda bianca nella parte esterna della coda



Assenza di ciuffi auricolari



Mantello grigio con parti rosso mattone



SCOIATTOLO VARIABILE (*Callosciurus finlaysonii*)

Specie introdotta in Italia; origine asiatica. Leggermente più piccolo dello scoiattolo rosso (adulti 200-250 g). Il mantello è marrone-olivastro nella parte superiore e color crema ventralmente; la coda è fulva, a volte con la parte apicale biancastra o crema. Tuttavia, si osservano, sia nel dorso sia nella coda, moltissime tonalità di colore o più colori insieme. I giovani presentano spesso un colore uniforme grigio-rossastro sulle parti dorsali e crema in quelle ventrali. Con il progredire dell'età, il colore chiaro del ventre si estende lungo i fianchi e ai lati del muso.



SCOIATTOLO A VENTRE ROSSO (*Callosciurus erythraeus*)

Specie introdotta in Italia; origine asiatica.

È leggermente più piccolo dello scoiattolo rosso (adulti in Italia 250-320 g). Il mantello è oliva marrone sul dorso, la testa, i fianchi e gli arti; talvolta tende al grigio sui fianchi e gli arti. Il ventre è tipicamente rosso in alcune popolazioni, giallo-arancione in altre. Negli animali a ventre rosso, anche parte del capo ha una colorazione simile. Zampe grigie, come il mento e la gola. Coda leggermente ad anelli con colorazione fulva nella parte iniziale e tendente al bianco all'estremità.



TAMIA SIBERIANO (*Tamias sibiricus*)

Specie introdotta in Italia; origine asiatica.

Piccolo scoiattolo (50-120 g) di colore giallo oca, con testa e parti posteriori bruno-rossastre. Sul dorso e i fianchi sono presenti cinque strisce longitudinali scure molto evidenti, alternate a bande chiare. Anche la coda presenta alternanza di bande chiare e scure in senso longitudinale. Le orecchie sono prive dei ciuffetti di peli caratteristici dello scoiattolo comune.



GHIRO (*Glis glis*)

Specie nativa in Italia. Non è uno scoiattolo, ma bensì un gliride. Il ghiro è inserito nella guida perché talvolta individui di questa specie sono scambiati per scoiattoli grigi.

Dimensioni più piccole degli scoiattoli (80-240 g). La colorazione del dorso e dei fianchi è grigio-bruna con tonalità che variano dall'ocra al grigio-argento. Il ventre è grigio chiaro o color crema. La coda è grigia come il resto del corpo, ma spesso tende al nero. Orecchie più rotonde ed evidenti rispetto agli scoiattoli. Gli scoiattoli sono ad attività diurna, il ghiro è notturno.




CONFRONTO TRA SPECIE

SCOIATTOLO ROSSO



SCOIATTOLO GRIGIO



Il mantello può essere di colore variabile, dal rosso al grigio, talvolta nero. I ciuffi auricolari in genere presenti, possono mancare in estate. In ogni caso, manca sempre la parte bianca nella parte esterna della coda.

Il mantello è grigio con parti rosso mattone sulle zampe, la testa, la coda e talvolta il dorso. Orecchie sempre senza ciuffi auricolari. È presente una banda bianca nella parte esterna della coda.

SCOIATTOLO GRIGIO



SCOIATTOLO VENTRE ROSSO




Il mantello è grigio cenere con parti rosso mattone; il ventre bianco. È presente una banda bianca nella parte esterna della coda. Orecchie sempre senza ciuffi auricolari.

Il mantello è oliva marrone sul dorso, la testa, i fianchi e gli arti; talvolta tende al grigio sui fianchi e gli arti. Il ventre è rosso o giallo-arancione (in Italia). Coda ad anelli con colorazione fulva nella parte iniziale e tendente al bianco all'estremità.

SCOIATTOLO GRIGIO



GHIRO



Il mantello è grigio con parti rosso mattone sulle zampe, la testa, la coda e talvolta il dorso; il ventre è bianco. Orecchie meno rotonde del ghiro. Presenza di una banda bianca nella parte esterna della coda. Attività diurna.

Il ventre è grigio chiaro o color crema. La coda è grigia come il resto del corpo, ma spesso tende al nero; manca la banda bianca esterna. Orecchie più rotonde ed evidenti rispetto agli scoiattoli. Attività notturna.

SCOIATTOLO ROSSO



Il mantello può essere di colore molto variabile, dal rosso al grigio, talvolta nero; il ventre è bianco. I ciuffi auricolari in genere presenti, possono mancare in estate.

SCOIATTOLO VARIABILE



Mantello marrone-olivastro nella parte superiore e crema ventralmente; la coda è fulva, a volte con la parte apicale chiara. Con l'età, il colore chiaro del ventre si estende lungo i fianchi e ai lati del muso. Ciuffi auricolari assenti